

### Регламент применения биостимулятора Витазим

Культура	Норма применения	Сроки и особенности применения
Озимые и яровые зерновые	0,5-1л/т	Предпосевная обработка семян совместно с протравителем.
	0,5-1л/га	Опрыскивание от весеннего кущения до выхода в трубку, когда начинает прощупываться первое междоузлие
Кукуруза	0,7-1л/т	Предпосевная обработка семян совместно с протравителем
	0,7-1л/га	Опрыскивание в фазу 5-8 листьев
Подсолнечник	1л/т	Предпосевная обработка семян совместно с протравителем
	0,5-1л/га	Опрыскивание в фазу 5-8 листьев
Соя	1л/т	Предпосевная обработка семян
	0,5-1л/га	Опрыскивание в фазу ветвления-бутонизации
Озимый рапс	0,5л/т	Предпосевная обработка семян
	0,5-1л/га	Опрыскивание осенью в фазе 5-6 листьев и весной в фазу стеблевания-бутонизации
Свекла, морковь		Обработка семян разбавленным 5% раствором Витазима
	0,5-1л/га	Опрыскивание в фазу смыкания рядов и в фазу смыкания листьев в междурядьях
Лук	1л/га	3 опрыскивания: в фазе -6-го листа, в период формирования и роста луковицы, по сформированной луковице до полегания пера
Томаты, огурцы, арбузы, дыни		Обработка семян разбавленным 5% раствором Витазима. Рассадку рекомендуется погрузить в 1-2% раствор или опрыскать после пересадки раствором Витазима – 0,5л/га
	1л/га	Листовая подкормка в фазу от 2-х настоящих листьев до начала цветения – 1л/га. Подкормка с интервалом 25-30 дней – 1л/га
Капуста	1л/га	Обработка семян разбавленным 5% раствором Витазима. Рассадку рекомендуется погрузить в 1-2% раствор Витазима или опрыскать после пересадки раствором Витазима – 0,5 л/га
		Листовая подкормка в период от 3-х листьев до начала завязывания кочана. Подкормка в середине вегетации во время роста кочана
Картофель		Обработка клубней разбавленным 5% раствором Витазима
	1л/га	Внекорневая подкормка во время достижения растениями высоты 15-20см. -1л/га. Внекорневая подкормка после цветения во время формирования и роста клубней -1л/га.
Клубника	1л/га	Внекорневые обработки во время массового цветения
Плодовые косточковые (персик, абрикос, вишня, черешня, слива)	1л/га	Одна внекорневая обработка по завязи. В случае поздних заморозков рекомендуется обработка для снятия стресса
Яблоня, груша	1,3-1,5л/га	2-3 внекорневые обработки: в фазе розового бутона, в фазу завязи после цветения, в фазу роста плодов «лесной-греческий орех». Для зимних сортов за 30-40 дней до уборки для улучшения «лежкости». В случае поздних заморозков рекомендуется обработка для снятия стресса
Виноград		Чубуки винограда замочить на 30-60 минут в разбавленном 5% растворе перед высаживанием. Черенки с корневой системой достаточно увлажнить в 2% растворе Витазима.
	1л/га	Взрослые насаждения – обработать почву вокруг корневой зоны во время раскрытия почек – 1 л/га. Обработать почву, листовую поверхность перед цветением – 1 л/га. Внекорневая подкормка во время созревания ягод – 1 л/га.

#### Способ использования Витазима:

Витазим используют в баковых смесях с пестицидами.

Норма рабочего раствора не критически важна, если придерживаться норм использования.

Витазим следует использовать в контексте целостной системы ухода, а не сам по себе.

Препарат оптимизирует систему ухода, давая растению возможность более эффективно использовать плодородие почвы и воду, позволяя увеличить продуктивность и уменьшить затраты. Витазим является очень эффективным и синергическим продуктом. При внесении его с удобрениями или микроэлементами, он значительно повышает их эффективность.

#### Способы внесения:

- капельное орошение;
- внекорневая подкормка;
- обработка почвы;
- обработка семян и рассады.

www.grinai.com

ПМР г.Тирасполь, ул.1 мая 2 корпус «к»

Р.М., г.Кишинев, ул. Богдан Воевод 7, оф.6А

E-mail: info@grinai.com

Моб.: +373 77 939 222

Моб.: +373 69 238 138